

Impfzeiten: Montag 13-18 Uhr, Dienstag 7-9 Uhr (nur mit Termin über Timeacle) und 13-16 Uhr, Donnerstag 13-20 Uhr, Freitag: 12-14 Uhr, Folgeimpfungen zu allen Impfzeiten ohne Termin möglich. Die folgenden Empfehlungen basieren auf Ihren Angaben sowie den dokumentierten Impfungen und berücksichtigen Reiseziele, -dauer und -stil.

Diesen Beratungsbogen bitte bei Folgeterminen vorlegen!

Tagos + Patchow

Name: Ernst von Martz Reiseziel(e): Nigeria Arzt: Filmann
15 Tage 16.5.19

| Impfungen | letzte Impfung | Terminvorschläge | Anmerkungen |
|---|----------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tetanus (Wundstarrkrampf) | 2007 | 10. MAI 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Bei erstmaliger Impfung: 3 Impfungen erforderlich Als Auffrischimpfung: <u>eine</u> Impfung alle 10 Jahre |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diphtherie | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Poliomyelitis (Kinderlähmung) | | 10. MAI 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Reisen in Endemiegebiete: <u>eine</u> Impfung alle 10 Jahre |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pertussis (Keuchhusten) | | | <ul style="list-style-type: none"> Empfohlen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Als Auffrischimpfung: <u>eine</u> Impfung in Kombination mit der nächsten Td oder Td + Polio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelbfieber | | 10. MAI 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Gültigkeit des Zertifikats: nach 10 Tagen, dann lebenslang Impfung nur in einer anerkannten Gelbfieber-Impfstelle möglich |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hepatitis A | | 1) 10. MAI 2019 2) | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 6-12 Monaten Impfschutz: länger als 20 Jahre |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hepatitis B | 2x 1996 | 1) <u>Booster</u> 2) 3) 10. MAI 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 3 Impfungen, 0-1-6 Monate Impfschutz: mindestens 15 Jahre |
| Hepatitis A+B | 1x 2007 | 1) <u>ni</u> 2) 3) | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 3 Impfungen, 0-1-6 Monate Impfschutz: >15 Jahre für Hepatitis B und > 20 Jahre für Hepatitis A |
| <input checked="" type="checkbox"/> Typhus | | 10. MAI 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Eine einmalige Injektion oder Einnahme von 3 Kapseln über 5 Tage Impfschutz: ca. 1 bzw. 3 Jahre (oral oder i.m.) |
| Meningokokken-Meningitis | | | <ul style="list-style-type: none"> ACWY: eine Impfung Bei anhaltendem Risiko: Auffrischung nach ca. 6-8 Jahren B: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen |
| Japanische Enzephalitis | | 1) 2) | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen Schnellimpfschema: 2 Impfungen an Tag 0 und 7 Bei anhaltendem Risiko: Auffrischung nach 1-2 Jahren |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tollwut | | 1) 10. MAI 2019 2) <u>17.5.19</u> 3) <u>30.5.19</u> | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 3 Impfungen an Tag 0, 7 und 21-28 Schnellimpfschema: 3 Impfungen an Tag 0, 3 und 7 Impfschutz laut WHO lebenslang; nach Tierbiss auch bei Geimpften, postexpositionell 2 Auffrischungs-Impfungen an Tag 0 und 3 |
| FSME | 3x 1993 | 1) 2) 3) | <ul style="list-style-type: none"> Grundimmunisierung: 3 Impfungen, 0,1 und 6-12 Monate Schnellimpfschema Tag 0, 7, 21 (nicht alle Impfstoffe) Impfschutz: ca. 5 Jahre |
| Pneumokokken | | | <ul style="list-style-type: none"> Einmalige Impfung bei Personen über 60 Jahre Alle 5 Jahre bei Personen mit chronischen Grundleiden, Diabetes, Immunschwäche, COPD u. a. |
| Grippe | | | <ul style="list-style-type: none"> Jährliche Impfung bei Personen über 60 Jahre und alle Personen mit chronischen Grundleiden, Diabetes, Immunschwäche u. a. Bei Tropenreisen ganzjährig zu empfehlen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Masern-Mumps-Röteln (MMR) | 2x 1996 | <u>2</u> | <ul style="list-style-type: none"> Empfohlen für alle Personen ohne Impfschutz oder Immunität Bei Erwachsenen schützt eine Impfung lebenslang |